

When Should I Call My Baby's Doctor?

Call 911 if your baby turns blue or has trouble breathing.

Call your baby's doctor if your baby has any of the following:

- Cries non-stop or is more irritable
- A temperature above 100 degrees Fahrenheit checked under the arm
- Frequent discharge from the eyes
- A hard time breathing
- Yellowing or rash on the skin that gets worse
- Redness, discharge or a foul smell from the healing umbilical cord
- Breastfeeding less often or taking less formula for more than 8 hours
- Green vomit or vomiting after more than 2 feedings in a row
- Hard to wake up
- No wet diaper for more than 8 hours
- Change in stool patterns, constipation or diarrhea
- Cough that will not go away, especially if there is a rash

If you have any concerns about your baby's health, call your baby's doctor, family doctor or health clinic. Never be shy about calling the doctor's office. Often talking to your baby's doctor or nurse will help you decide if your baby needs medical care. When you call the doctor, have written down:

- What is wrong with your baby
- Baby's temperature
- The name and phone number of your pharmacy

Keep a paper and pen nearby to write down the doctor's instructions.

2/2007. Developed through a partnership of Mount Carmel Health, Ohio State University Medical Center, and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.

When Should I Call My Baby's Doctor. French.

Quand dois-je appeler le pédiatre de mon bébé ?

Appelez le 911 si votre bébé devient bleu ou s'il a des difficultés à respirer.

Appelez le pédiatre de votre bébé si votre bébé présente un des symptômes suivants :

- s'il pleure sans cesse et est plus irritable
- une température supérieure à 37,8 °C (100 degrés Fahrenheit) prise sous le bras
- un écoulement fréquent au niveau des yeux
- des difficultés à respirer
- si sa peau devient jaune ou que vous constatez une rougeur cutanée qui empire
- si vous observez des rougeurs, un écoulement ou une odeur fétide au niveau du cordon ombilical en guérison
- s'il prend le sein moins fréquemment ou s'il prend moins le biberon pendant plus de 8 heures
- des vomissements verts ou des vomissements après plus de 2 allaitements consécutifs
- des difficultés à se réveiller
- s'il ne mouille pas de couches pendant plus de 8 heures
- des modifications de l'apparence des selles, une constipation ou une diarrhée
- une toux qui persiste, particulièrement en cas d'éruption cutanée

Si vous avez des inquiétudes sur la santé de votre bébé, appelez votre pédiatre, votre médecin de famille ou une clinique. N'hésitez jamais à appeler le cabinet du pédiatre. Avoir des contacts fréquents avec le pédiatre ou l'infirmière de votre bébé vous aidera à prendre des décisions relatives aux soins de votre bébé. Avant d'appeler le pédiatre, inscrivez sur un papier :

- ce qui ne va pas chez votre bébé
- la température du bébé
- le nom et le numéro de téléphone de votre pharmacie

Ayez un papier et un stylo à proximité du téléphone pour noter les instructions du pédiatre.

2/2007. Developed through a partnership of Mount Carmel Health, Ohio State University Medical Center, and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.

When Should I Call My Baby's Doctor. French.